

Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság

7800 Siklós, Táncsics M. u. 20., Postai cím: 7801 Siklós, Pf.: 125.,

Tel./ Fax: 72/579-242, 30/216-45-61, e-mail: szarkat@t-online.hu

Házikerti gyümölcsösök, szőlő növényvédelmi technológiai javaslata 2009. április 01. és 10. közötti időszakra

Alma, körte

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
varasodás	Sythane Duplo	miklobutanil	0,03%	0	14
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	-
tűzelhalás	Rézoziklorid 50	rézoziklorid	0,6%	0	14

Őszibarack

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
monilia	Signum WG	boscalid piraklostrobin	0,1%	0	7
tafrina	Delan 700 WG	ditianon	0,8%	0	21

Meggy, Kajsziarack, Szilva

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
monilia	Signum WG	boscalid piraklostrobin	0,1%	0	7

Gyümölcs- és szőlőültetvények rügypattanás kori lemosó permetezésre

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
lisztharmattal 2008-ban fertőződött ültetvény esetében					
lisztharmat atka, pajzstetű	Agrokén (Nevikén, Nevikén Extra)	poliszulfid kén	2 - 3%	0	-
	Tiosol	kalcium- poliszulfid	2 - 3%	0	-
2008-ban többféle fertőzést elszenvedett ültetvény esetében					
gombák, atka, pajzstetű, baktériumok	Vektafid R	rézoleát, olaj	1 - 3%	0	21

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)

ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Jelenleg kifejezetten erős fertőzésveszély áll fent:

cseresznye, meggy:	monília, levéltetű, lombormányos
alma, körte:	tűzelhalás, lisztharpat, varasodás, levéltetű, lombormányos
őszibarack:	tafrina, levéltetű

A meggy és cseresznye **virágfertőző monília gombabetegség ellen a virágzásban** mindenképpen védekezni szükséges. A permetezések száma az időjárás és a fajtaérzékenység függvénye. Csapadékos, hűvös időjárás, elhúzó virágzás esetén legalább két védekezés szükséges a virágzás alatt. A sikeres védekezés egyik feltétele a megelőző védekezés. Erős fertőzés helyzetben (köd, csapadék, hűvös idő) a permetezést 5-7 naponta kell elvégezni.

Monília ellen alkalmazható készítmények:

- Chorus 50 WG/75 WG
- Dithane M-45, Dithane DG Neo-Tec, Manzate, Vondozeb Plus
- Mirage 45 EC
- Signum WG
- Systhane Duplo
- Topas 100 EC

Több növényen (leginkább dísznövények) erős levéltetű fertőzés indult meg. A levéltetvek ellen ebben az esetben speciális készítménnyel kell védekezni (pl. Chess 50 WG).

Gyümölcs- és szőlőültetvények rügypattanáskori lemosó permetezésre

A kezelést rügypattanáskor, szélcsendes időben, száraz ültetvényben kell elvégezni, fagymentes időben. A permetezést követő 4 órán belül lehulló csapadék a kezelés hatékonyságát jelentősen csökkenti. A kezelést az elmúlt évben súlyos fertőzést elszenvedett ültetvényekben mindenképpen szükséges elvégezni

A felsorolt készítmények környezetbarát minősítésűek (zöld vagy sárga besorolásúak), és II. vagy III. forgalmi kategóriába sorolt tartoznak.

További szakmai információ kérhető a szarkat@t-online.hu elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61 mobil telefonszámon 17:00 és 19:00 között.

Siklós, 2009. április 01.

Szarka Tibor György
okl. agárkémikus agrármérnök